

※3月4日プレスリリースの第2報です。



令和8年3月5日
川口市保健所

麻しん（はしか）患者が発生しました（第2報）

令和8年3月3日、川口市保健所に届出があった麻しん患者について、行動調査を実施した結果、以下の施設を利用していることが判明したことから、感染の可能性がある時間帯に当該施設を利用された方で、麻しんを疑う症状（高熱・発疹・咳・鼻水・目の充血等）が現れた場合は、事前に居住地を所管する保健所に電話連絡の上、指示に従い医療機関を受診してください（特にワクチン未接種の方についてはご注意ください）。

また、受診の際は、感染拡大防止の観点から、公共交通機関の利用は避けてください。

【麻しん患者が利用した施設】

感染の可能性がある時間帯 (健康観察期間)	施設名	所在地
令和8年2月24日(火) 13:30~15:35 (令和8年3月17日(火)まで)	セブン-イレブン 葛西三角通り店	東京都江戸川区中葛西 1-49-16
令和8年2月25日(水) 13:00~16:00 (令和8年3月18日(水)まで)	からあげ専門店「からやま」 埼玉戸田店	戸田市上戸田2-6-1
令和8年2月26日(木) 13:00~15:05 (令和8年3月19日(木)まで)	セブン-イレブン 幕張本郷2丁目店	千葉県千葉市花見川区 幕張本郷2-16-6
令和8年2月27日(金) 14:30~17:30 (令和8年3月20日(金)まで)	イオンモール北戸田 2階フロア	戸田市美女木東1-3-1

※ 施設への問い合わせは、ご遠慮くださいますようお願いいたします。

※ この時間帯以外に利用された場合は、感染の心配はありません。また、商品を介して感染することはありません。今後も安心してご利用ください。

【麻疹の症状等】

- ・ 麻疹の潜伏期間は、通常10～12日間（最短5日間～最大21日間）
- ・ 麻疹患者と接触した場合には、接触後21日間、注意が必要です。
- ・ 麻疹に感染すると、約10日後に38℃程度の発熱や咳、鼻水といった風邪のような症状が2～4日続き、その後39℃以上の高熱とともに発疹が出現します。

【参考】

麻疹(はしか)について

1 症状

- ・ 感染すると通常10日から12日後に38℃前後の発熱、咳、鼻汁、くしゃみ、結膜充血など風邪のような症状が約2日から4日間続き、解熱後、再び39℃以上の高熱と発しん(耳の後ろや首あたりから、身体、手足へと広がる)が出現します。
- ・ 肺炎、中耳炎や脳炎を合併しやすく、患者1,000人に1人の割合で脳炎が発症すると言われており、死亡する割合も、先進国であっても1,000人に1人と言われています。

2 感染経路

- ・ 麻疹は「はしか」とも呼ばれ、麻疹ウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症(急性熱性発疹性疾患)です。
- ・ 麻疹ウイルスの主たる感染経路は空気感染で、その感染力は非常に強く、免疫を持っていない人が感染するとほぼ100%発症すると言われています。
- ・ 発症した人が周囲に感染させる期間(感染可能期間)は、症状が出現する1日前から解熱後3日間まで(全経過を通じて発熱がみられなかった場合、発しん出現後5日間まで)と言われています。

3 潜伏期間

約10日～12日間(最長21日間程度になる場合もあります。)

4 治療

特異的な根治療法はなく、症状を和らげる治療(対症療法)を行う。

5 予防

- ・ 麻疹は感染力が強く、空気感染もするので、手洗い、マスクのみでは十分に予防できません。
- ・ 麻疹の予防には予防接種が最も有効です。2回の定期接種を必ず受けましょう。
- ・ 麻疹を発症した場合、学校や職場等で感染を拡大させる恐れがあるため、母子手帳などで予防接種歴を確認し、定期予防接種を2回受けていない方や予防接種歴が不明な方は、かかりつけ医などに相談の上、接種を検討しましょう。

6 市内の発生状況(麻疹届出数)

年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年
川口市	0	8	0	0	0	0	0	2	2
埼玉県	16	35	0	1	0	0	8	13	6
全国	279	744	10	6	6	28	45	265	71

※ 川口市の2018年は4月1日～12月31日、2026年は1月1日～3月3日の届出数

※ 埼玉県の2026年は、県の感染症発生動向調査 第9週(2月23日～3月1日)までの累積速報値

※ 全国の2026年は、国の感染症発生動向調査 第8週(2月16日～2月22日)までの累積速報値