




寝^ねている赤ちゃんの いのち^{あか}を守るために^{まも}



エスアイディーエス^し SIDSを知っていますか？

にゅうよう^じ とつぜん^し しょうこうぐん^し エスアイディーエス
乳幼児突然死症候群(SIDS)とは
それまで大きな異常のきざしがないのに、乳幼児
が睡眠中に亡くなってしまう原因不明の病気で、
窒息などの事故とは異なります。特に、1歳未満の
赤ちゃんがいる場合、気を付ける必要があります。

●令和6年には55名の乳幼児がSIDSで亡くなり、乳幼児の死亡原因
の第3位です。

SIDSの予防方法は確立していませんが、以下の3つのポイントを守ること
でSIDSの発症率が低くなるというデータがあります。



1歳^{さい}になるまでは 「あおむけ」に寝^ねかせましょう



SIDSは睡眠中に起こります。うつぶせ寝、あおむけ寝
のどちらの体勢でも起こって
いますが、あおむけに寝か
せたほうが発症率が低い
ことが研究でわかっています。
医学上の理由でうつぶせ寝
を勧められている場合以外は、赤ちゃん
の顔が見えるあおむけに寝かせましょう。
睡眠中の窒息事故を防ぐ上でも有効
です。

無理^{むり}のない範囲^{はんい}で 母乳育児^{ぼにゅういくじ}を



母乳で育てられている赤ちゃんのほ
うが、SIDSの発症率が低いことが研究
でわかっています。
様々な事情があり、
すべての人が母乳育児
ができるわけではありません。授乳に関して少
しでも不安を感じる
場合は、病院や保健
センターなどに相談
してみましょう。

たばこはやめましょう



たばこもSIDSの発生
要因のひとつであると
いわれています。乳幼児
の周囲で誰かがたばこを
吸うことは、SIDSの発症率を高くするこ
とがわかっています。妊婦自身の喫煙、
まわりの人が吸ったたばこの副流煙を
妊婦が吸う「受動喫煙」も生まれた後
にSIDSの発生要因になります。
こどもに関わるすべての大人は喫煙
をやめましょう。



こども家庭庁ホームページで
ご覧いただけます

すい^{みんちゆう} あか^し ぼう^{げん} いん^{いん} エスアイディーエス
睡眠中に赤ちゃんが死亡する原因には、SIDSのほか、
窒息^{しこ}などによる事故があります。窒息の予防策は裏面をご覧ください。

こども家庭庁CDRポータルサイト
「赤ちゃんが突然亡くなる『SIDS』発症リスクを
おさえるためにできることとは」
<https://cdr.cfa.go.jp/contents/2024/03/>



お問い合わせ
乳幼児突然死症候群(SIDS)については、
各都道府県・市区町村の母子保健担当課及び
保健所・保健センターなどで
ご相談に応じています。


眠っている赤ちゃんの窒息を防ぐためにチェックしたい5つのこと

赤ちゃんのまわりの環境を整えることで、SIDSだけでなく「睡眠中の窒息」も防ぐことができます。一日の多くを眠って過ごす赤ちゃんにとって、睡眠時の環境はとても大切です。ここでは、窒息のリスクを下げる5つのポイントをご紹介します。



1 寝具は硬めで平坦なものを

柔らかいクッションや傾斜のあるマットレスは避け、身体が沈まない硬めで平坦な布団やマットレスを使いましょう。



2 温度の調整は着るものなどで

掛け布団は赤ちゃんの顔にかかると窒息のリスクがあります。1歳までは掛け布団は使用せず、スリーパーなどの着るものや空調で寒さを調整すると安心です。



3 寝床には何も置かず、すっきりと

ぬいぐるみやタオルなどは窒息のリスクにつながります。赤ちゃんのまわりは何も置かず、シンプルに整えましょう。



4 赤ちゃん専用の寝床が安心につながります



大人の身体が赤ちゃんに覆い被さったり口や鼻を塞いでしまったりする危険がある「添い寝」には注意をしましょう。

5 睡眠環境製品は正しく使いましょう

ベビーベッドやベッド柵などは、国が定めた安全基準の検査に合格した製品を選び、説明書をよく読んで、対象年齢や使い方を必ずチェックしましょう。



■以下の場合の添い寝は特に危険です。

- 添い寝している人が眠気を引き起こしたり、注意力を低下させる薬を服用したりしている場合
- 添い寝している人が飲酒をした場合
- 赤ちゃんが早産や低出生体重で生まれた場合

赤ちゃんの睡眠時のすべてのリスクを避けることは難しいですが、無理なく、できることから始めてみませんか。

こどもまんなか
こども家庭庁



健やか親子21